



UE 7

INDICATEURS DE SANTÉ

Annales

Pr. Baumann



Tutorat Santé Lorraine
Année 2025-2026

2023 - 2024

A propos des indicateurs en santé, cochez la(es) réponse(s) exacte(s) :

- A. Ils peuvent être utilisés pour mesurer l'ampleur d'un problème de santé dans un échantillon donné.
- B. Ils résultent d'un agrégat d'observations faites le plus souvent à l'échelle des individus.
- C. Ils peuvent être utilisés pour mesurer l'ampleur d'un facteur de risque ou déterminant dans un échantillon donné.
- D. Ils se présentent systématiquement sous la forme d'un taux.
- E. Ils peuvent se présenter sous plusieurs formes selon la nature de l'information collectée à l'échelle individuelle.

A propos des sources de données en santé, cochez la(les) réponse(s) exacte(s) :

- A. Les observatoires sont des registres de maladies.
- B. La surveillance par échantillon est une méthode de collecte de données incluant notamment les réseaux sentinelles.
- C. Un réseau sentinelle collecte en continu des informations sur des indicateurs de santé par le biais d'un échantillon de médecins généralistes.
- D. Les études ou enquêtes ad hoc constituent la source de données en santé la plus fiable.

A propos des indicateurs de mortalité, cochez la(les) réponse(s) exacte(s):

- A. L'espérance de vie reflète les conditions de mortalité prévalant dans la population considérée à un moment donné.
- B. Le taux de mortalité prématurée est le nombre de décès, au cours de l'année, d'individus âgés de moins de 55 ans, rapporté à la population moyenne totale des moins de 55 ans.
- C. Les indicateurs de mortalité se présentent toujours sous la forme d'un taux ou d'un pourcentage.
- D. Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès d'enfants de moins d'un an rapporté au nombre de naissances vivantes la même année.
- E. Le taux de mortalité en France se situe aux alentours de 0,9 pour 1000 habitants.



L'incidence d'une maladie :

- A. Se définit par le nombre de nouveaux malades dénombré à un instant donné, dans une population donnée
- B. Se définit par le nombre de malades dénombré à un instant donné, dans une population donnée
- C. Se définit par le nombre de nouveaux malades au cours d'une période de temps donnée
- D. Est une mesure dynamique du flux d'une maladie
- E. Peut se présenter sous la forme d'un nombre

A propos des indicateurs de mortalité :

- A. Un taux brut de mortalité est considéré comme un indicateur simple
- B. La mortalité juvéno-infantile concerne les enfants âgés de 1 à 5 ans
- C. La mortalité prématurée concerne les individus de moins de 50 ans
- D. L'espérance de vie à la naissance est un indicateur de bonne santé
- E. Les indicateurs de mortalité s'expriment toujours sous la forme de taux



2021 - 2022

Concernant les indicateurs de mortalité :

- A. Le taux brut de mortalité est un indicateur de mortalité composite
- B. La mortalité prématurée concerne les individus de moins de 65 ans
- C. L'espérance de vie à la naissance est un indicateur de mortalité
- D. La mortalité infantile concerne les enfants âgés de 1 à 5 ans
- E. Le nombre de décès survenus au cours d'une période donnée est un indicateur de mortalité



Correction : 2023 - 2024

Item A, B, C et E sont justes

A. Vrai : Justifié par l'épidémiologie descriptive, qui étudie la distribution des problèmes de santé au sein des populations humaines.

B. Vrai : Définition du cours : Ils résultent d'un agrégat de données résultant d'observations faites à l'échelle d'unités statistiques, le plus souvent d'individus.

C. Vrai : Ils permettent de rechercher des facteurs de risques de maladies au sein de la population.

D. Faux : L'indicateur peut prendre plusieurs formes : nombre, proportion, ratio, indice, taux...

E. Vrai : Selon la nature quantitative ou qualitative, l'indicateur peut se présenter sous plusieurs formes.

Item B et C sont justes

A. Faux : Les observatoires fonctionnent comme les registres MAIS ce sont des recueils qui ne sont pas exhaustifs ni continus, seulement quelques cas de la maladie y sont répertoriés.

B. Vrai : La surveillance par échantillons inclut les réseaux sentinelles et les observatoires.

C. Vrai : Il collecte en continu des informations sur certains indicateurs de santé en s'appuyant sur un échantillon de médecins généralistes volontaires.

D. Faux : Les enquêtes ad hoc sont souvent une source fiable de données pour des questions spécifiques, mais pas nécessairement la source la plus fiable

Item A et D sont justes

A. Vrai : L'espérance de vie à la naissance est un indicateur de mortalité, elle est calculée pour une année donnée, et correspond à l'espérance mathématique.

B. Faux : Le taux de mortalité prématurée est le nombre de décès, au cours de l'année, d'individus âgés de moins de 65 ans, rapporté à la population moyenne totale des moins de 65 ans de la même année.

C. Faux : Les indicateurs de mortalité ne sont pas toujours des taux ou pourcentages, certains peuvent être des nombres absolus comme le nombre de décès ou les années de vies perdues.

D. Vrai : $(\text{nombre d'enfants nés vivants et décédés avant 1 an}) / (\text{nombre de naissances vivantes la même année})$.

E. Faux : Le taux de mortalité en France est de 9 pour 1000 habitants.



Correction : 2022 - 2023

Item C, D et E sont justes

A. Faux : C'est durant une période et non à un instant

B. Faux : C'est le nombre de nouveaux cas d'une maladie apparus au sein d'une population et durant une période donnée

C. Vrai : Voir item B

D. Vrai : Le taux d'incidence donne une mesure dynamique du flux des maladies

E. Vrai : Un effectif = nombre de cas incident

Aucun item est juste (*c'était possible avant*)

A. Faux : C'est un indicateur brut.

B. Faux : C'est la mortalité des enfants de moins de 5 ans.

C. Faux : Des individus de moins de 65 ans.

D. Faux : C'est un indicateur de mortalité qui reflète l'état de santé à un instant donné mais il ne peut pas prédire le nombre d'années de vie.

E. Faux : Ils peuvent être exprimés sous forme de moyenne ou de proportion.



Correction : 2021 - 2022

Item B, C et E sont justes

A. Faux : Le taux brut de mortalité est un indicateur brut.

B. Vrai.

C. Vrai.

D. Faux : La mortalité infantile concerne les enfants de la naissance à la première année de vie.

E. Vrai.

