




UE 8

PRÉVENTION GYNÉCOLOGIQUE



Annales

Pr. Morel



Tutorat Santé Lorraine
Année 2025-2026

En matière de prévention du cancer du col, quelles sont les recommandations actuelles? Indiquez les bonnes réponses.

- A. Il n'y a pas besoin de dépistage spécifique si la vaccination contre l'HPV a été faite
- B. Un frottis cervico-vaginal doit être fait dès 25 ans et tous les 5 ans
- C. Un frottis cervico-vaginal doit être fait dès 20 ans et un test HPV direct après 35 ans
- D. Un frottis cervico-vaginal doit être fait dès le début de la vie sexuelle et un test HPV dès 30 ans
- E. Un frottis cervico-vaginal doit être fait dès 25 ans, puis un test HPV direct dès 30 ans

Contre quelles infections sexuellement transmissibles (IST) peut-on être vacciné(e) ?

- A. La syphilis
- B. L'hépatite B
- C. Le Chlamydiae
- D. Le VIH (Virus de l'immunodéficience humaine)
- E. Le Papillomavirus

Quels moyens de prévention existe-t-il pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles (IST) ? Indiquez les réponses vraies.

- A. Les antibiotiques
- B. Le préservatif féminin
- C. Le préservatif masculin
- D. La contraception oestroprogestative
- E. Le vaccin



Quels moyens de prévention existent pour lutter contre les transmissibles (IST) ? :

- A. Les antibiotiques.
- B. Le préservatif masculin.
- C. La contraception oestroprogestative.
- D. Le préservatif féminin.
- E. Le vaccin.

Contre quelles infections sexuellement transmissibles (IST) peut-on être vacciné(e) ? :

- A. Les antibiotiques.
- B. L'hépatite B.
- C. L'infection à chlamydiae.
- D. L'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine).
- E. L'infection à HPV (Human Papillomavirus)

Pour quelle tranche d'âge le dépistage organisé du cancer du sein est réalisé en France ? :

- A. De 45 à 82 ans.
- B. De 50 à 74 ans.
- C. De 50 à 82 ans.
- D. De 55 à 68 ans.
- E. De 60 à 90 ans.

Quels moyens de prévention existent-ils pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles (IST) ? :

- A. Le Dispositif Intra Utérin (DIU)
- B. Le préservatif masculin
- C. La contraception oestroprogestative
- D. Le préservatif féminin
- E. Le vaccin

Contre quelles infections sexuellement transmissibles (IST) peut-on être vacciné(e) pour les garçons et les filles ? :

- A. La syphilis
- B. L'infection à chlamydiae
- C. L'hépatite B
- D. L'infection au VIH (virus de l'immunodéficience humaine)
- E. L'infection à l'HPV (Human Papillomavirus)

Quelles sont les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) qui peuvent être véhiculées par des rapports bucco-génitaux:

- A. L'hépatite B
- B. La syphilis
- C. L'infection par le VIH
- D. L'herpès
- E. L'infection par le papillomavirus (HPV)



Quels types d'infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent être retrouvés ? :

- A. Mycosique
- B. Viral
- C. Bactérien
- D. Vénérien
- E. Parasitaire

Quelles infections sexuellement transmissibles (IST) sont curables ? :

- A. La syphilis
- B. L'hépatite B
- C. L'infection à chlamydiae
- D. L'infection au VIH (virus de l'immunodéficience humaine)
- E. L'infection au HPV (Human Papillomavirus)

Quels moyens de prévention existent pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles (IST) ? :

- A. Les antibiotiques
- B. Le préservatif masculin
- C. La contraception œstroprogestative.
- D. Le préservatif féminin
- E. La vaccin



A partir de combien de temps après un rapport sexuel à risque peut-on être dépisté contre le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), de manière avérée, selon deux différentes méthodes ? :

- A.** Le lendemain du rapport à risque
- B.** 2 semaines après le rapport à risque
- C.** Un mois après le rapport à risque
- D.** 6 semaines après le rapport à risque
- E.** 3 mois après le rapport à risque



Correction : 2023 - 2024

Item E est justes

- A. Faux :** La vaccination ne protège pas contre tous les types d'HPV. il est important de dépister toutes les femmes pour pouvoir mettre en place une prise en charge rapide.
- B. Faux :** Selon les recommandations de l'HAS : un frottis cervico-vaginal doit être fait à partir de 25 ans tous les 3 ans, puis à partir de 30 ans tous les 5 ans jusqu'à 65 ans.
- C. Faux :** On fait à partir de 25 ans un examen cytologique puis à partir de 30 ans un test HPV direct.
- D. Faux.**
- E. Vrai :** C'est exact selon les recommandations de l'HAS.

Item B et E sont justes

- A. Faux :** il n'existe pas de vaccin, le seul moyen de prévention est le préservatif.
- B. Vrai.**
- C. Faux :** il n'existe pas de vaccin, le seul moyen de prévention est le préservatif.
- D. Faux :** il n'existe pas de vaccin, le seul moyen de prévention est le préservatif.
- E. Vrai.**

Item B, C et E sont justes

- A. Faux :** C'est un traitement utilisé pour soigner les IST mais il ne permet pas de lutter contre leur apparition.
- B. Vrai :** C'est un moyen de prévention.
- C. Vrai :** C'est un moyen de prévention.
- D. Faux :** Elle ne permet pas de se protéger des IST.
- E. Vrai :** Il permet de lutter contre l'apparition des IST. Il existe le vaccin pour HPV et l'hépatite B.



Correction : 2022 - 2023

B,D et E sont justes.

A. Faux : C'est pour le traitement et non la prévention.

B. Vrai : Protège de toutes les infections.

C. Faux : Les contraceptions hormonales ne protègent pas des IST.

D. Vrai : Protège de toutes les infections.

E. Vrai : Il existe des vaccins pour HPV et l'hépatite B.

B et E sont justes.

A. Faux : Il n'y a pas de vaccin.

B. Vrai : Ce vaccin est d'ailleurs obligatoire pour tous les enfants nés à partir de 2018.

C. Faux : Il n'y a pas de vaccin.

D. Faux : Il n'y a pas de vaccin.

E. Vrai : Il est recommandé chez les jeunes filles et garçons dès 11 ans.

B est juste.

A. Faux : Cf. item B

B. Vrai : C'est bien cette tranche d'âge

C. Faux : Cf. item B

D. Faux : Cf. item B

E. Faux : Cf. item B



Correction : 2021 - 2022

B, D et E sont justes.

A. Faux : Le DIU est uniquement un moyen de contraception et n'a aucun rôle dans la protection contre IST. Il peut d'ailleurs y rendre plus sensible en créant une inflammation de la paroi utérine.

B. Vrai : A à la fois un rôle contraceptif et bloque la transmission d'IST (il est aussi appelé préservatif externe).

C. Faux : La pilule est uniquement contraceptive.

D. Vrai : Pareil que le préservatif masculin. (Egalement appelé préservatif interne)

E. Vrai : Certains vaccins contre des IST existent comme le vaccin contre les HPV ou encore l'hépatite B.

C et E sont justes.

A. Faux : Il n'existe pas de vaccins contre cette infection.

B. Faux : Non plus.

C. Vrai : Ce vaccin existe et est accessible quelque soit le sexe. Il est d'ailleurs obligatoire pour certaines profession dont les professionnels de santé (en raison de forte transmissibilité par le sang) !

D. Faux : Malgré beaucoup de recherches toujours pas de vaccin contre le VIH malheureusement !

E. Vrai : Ce vaccin est principalement recommandé pour les filles avant le début de leur vie sexuelle et il s'élargit de plus en plus au garçon également (principalement s'ils ont des relations homosexuelles).

A, B, D et E sont justes.

A. Vrai

B. Vrai

C. Faux : Le risque est faible.

D. Vrai: On parle d'herpès génital. L'herpès labial n'est pas une IST.

E. Vrai



Correction : 2020 - 2021

B, C et E sont justes.

A. Faux : Cf. item B

B. Vrai : Les IST virales, bactériennes ou parasitaires se transmettent lors des rapports sexuels par voie génitale, oro-génitale ou ano-génitale.

C. Vrai : Cf. item B.

D. Faux : Cf. item B.

E. Vrai : Cf. item B.

A et C sont justes.

A. Vrai : Elle se traite par antibiotiques.

B. Faux : Les infections virales sont incurables.

C. Vrai : Elle est bactérienne et se traite par antibiotiques.

D. Faux : Les infections virales sont incurables.

E. Faux : Les infections virales sont incurables.

B, D et E sont justes.

A. Faux : Les préservatifs et le vaccin sont les seuls moyens de protection contre les IST.

B. Vrai : Cf. item A

C. Faux : Cf. item A

D. Vrai : Cf. item A

E. Vrai : Pour le HPV ou l'hépatite B par exemple.



D est juste.

A. Faux : Cf. item D

B. Faux : Cf. item D

C. Faux : Cf. item D

D. Vrai : Les deux méthodes sont l'analyse sanguine et le test de dépistage rapide.

E. Faux : Cf. item D

